

PZN: 16149603	Datum: 10.01.23
Produktname: diarrhoesan® elektrolyt	Dr. Loges + Co. GmbH Schützenstraße 5 21423 Winsen (Luhe)

Status:

- ☐ Nahrungsergänzungsmittel ☐ Lebensmittel ☒ diätetisches Lebensmittel
☐ _____

Zutaten:

Dextrose-Anhydrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Heidelbeer-Fruchtpulver, Heidelbeer-Extrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose

Zusammensetzung:

Nährwertdeklaration	Pro 100 g	Pro 100 ml	Pro Portion	
			1 Beutel	2 Beutel
Energie	1.417 kJ/333 kcal	45 kJ/11 kcal	89 kJ/21 kcal	178 kJ/42 kcal
Fett	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,1 g	0 g	0 g	0 g
Kohlenhydrate	76 g	2,4 g	4,8 g	9,6 g
davon Zucker	62 g	2,0 g	3,9 g	7,8 g
Glukose (Dextrose)	60 g	1,9 g	3,8 g	7,6 g
Eiweiß	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
Salz	11 g	0,35 g	0,69 g	1,4 g
Natrium	4.384 mg	138 mg	276 mg	552 mg
Kalium	2.481 mg	78 mg	156 mg	312 mg
Chlorid	4.508 mg	142 mg	284 mg	568 mg

Packung enthält 10 bzw. 5 Portionen.

Konzentration der fertigen Lösung:

Natrium 60 mmol/l
 Kalium 20 mmol/l
 Chlorid 40 mmol/l
 Citrat 16 mmol/l
 Glukose (Dextrose) 105 mmol/l
 Osmolarität nach Zubereitung: ca. 241 mmol/l

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Bitte bewahren Sie diarrhoesan® elektrolyt an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

10 Portionsbeutel = 63 g

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Anwendungshinweis:

Der Inhalt eines Beutels wird - unmittelbar vor Verwendung - in 200 ml Trinkwasser gelöst und direkt getrunken. Achten Sie bei der Zubereitung bitte genau auf das angegebene Mischungsverhältnis.

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach dem individuellen Bedarf, in der Regel mehrmals täglich bzw. nach jedem flüssigen Stuhlgang:

- Kleinkinder (1 bis 3 Jahre): 3 bis 5 Beutel in 24 Stunden
- Kinder ab 4 Jahre: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, maximal 8 Beutel in 24 Stunden
- Jugendliche und Erwachsene: 1 bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie beträgt bei Kleinkindern in der Regel 6-12 Stunden und sollte 24 Stunden nicht überschreiten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Bis zum Abklingen des Durchfalls, höchstens 36 Stunden. Sollte der Durchfall länger andauern, ist nochmals der Arzt aufzusuchen.