

sanotact®

Laktase

6h DEPOT 24.000

- ✓ Zur Unterstützung der Verdauung von Milchprodukten
- ✓ 40 Tabletten in praktischer Tablettenbox – ideal für unterwegs
- ✓ Extra hoch dosiert: 24.000 FCC pro Tablette
- ✓ Wirkt sofort und dank Depot für bis zu 6h



Produktbeschreibung

sanotact® Laktase 24.000 6h Depot Tabletten - zur Verbesserung der Verdauung von Laktose (auch bekannt als Milchzucker) bei Personen, die mit Problemen bei der Verdauung von Laktose zu kämpfen haben.

Um sich einige Stunden keine Sorgen über den Verzehr von milchzuckerhaltigen Snacks machen zu müssen, sind die **sanotact® Laktase 24.000 6h Depot** Tabletten ideal. Das enthaltene Laktaseenzym wird durch die besondere Rezeptur verzögert abgegeben und wirkt somit über einen längeren Zeitraum.

Für viele Personen bedeutet ein Latte-Macchiato, ein Frühstücks-Brunch oder eine Einladung bei Freunden zum Grillabend Lebensqualität und schöne Stunden. Diese Unbeschwertheit kann durch eine Laktoseintoleranz getrübt werden. Laktose ist in vielen Lebensmitteln, nicht nur in Milch, enthalten. Von Laktoseintoleranz betroffene Personen können den Milchzucker, der über die Nahrung aufgenommen wird, nur unvollständig oder gar nicht verdauen, da ihr Organismus das Enzym Laktase nicht oder nicht in ausreichender Menge selbst produzieren kann. Die unverdaute Laktose gelangt so in den Dickdarm, wo sie oft unmittelbar oder einige Stunden nach dem Verzehr von milchzuckerhaltigen Nahrungsmitteln zu unangenehmen Beschwerden wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen führt. Das körpereigene Enzym Laktase spaltet den Milchzucker in die für den menschlichen Körper verwertbaren Zucker Galaktose und Glucose. So können durch die Einnahme des notwendigen Enzyms die typischen Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Durchfall vermieden werden. Da es sich um ein körpereigenes Enzym handelt, kann Laktase nicht überdosiert werden und es kommt zu keinem Gewöhnungseffekt.

Durch die praktische Tablettenbox sind die Laktase Tabletten immer im Alltag dabei und passen in jede (Hosen-)Tasche!

Durch die Einnahme von Laktase kann die körpereigene Laktaseproduktion nicht beeinflusst werden, sodass bei einem längeren oder überschüssigen Verzehr keine nachteiligen Wirkungen zu erwarten sind.

Der Grad der Laktoseintoleranz ist von Person zu Person unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich über die Funktion der Laktase bei Ihrer Ernährung.

Laktose-Verarbeitung im Darm

mit Laktase



ohne Laktase



Zutaten / Nährstoffe

Zutaten: Füllstoff (mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose), Maltodextrin, Laktase, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).

Inhaltsstoff	pro Tablette
Laktase	24.000 Laktase-FCC-Einheiten

sanotact®

Laktase

6h DEPOT 24.000

Verzehrempfehlung

1 **sanotact® Laktase 24.000 6h Depot** Tablette unmittelbar vor (aber nicht auf nüchternen Magen) oder während des Verzehrs von milchzuckerhaltigen Produkten einnehmen. Der Bedarf an zuzuführender Laktase muss individuell festgelegt werden. Er richtet sich nach der körpereigenen Laktaseproduktion und der in Speisen und Getränken enthaltenen Menge an Milchzucker. Aber auch die Art der Nahrung – flüssig oder fest – ist zu beachten. Ebenso spielen die Verweildauer des Speisebreis im Verdauungssystem sowie der Zustand der Darmflora eine wichtige Rolle.

Inhalt

Eine Packung enthält 40 Tabletten verpackt in einer praktischen Tablettenbox. Gratis Laktosegehalt-Tabelle in der Verpackung.