

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Solidago Steiner® Lösung jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Solidago Steiner® Lösung und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Solidago Steiner® Lösung beachten?
3. Wie ist Solidago Steiner® Lösung einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Solidago Steiner® Lösung aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Solidago Steiner® Lösung

STEINER
Arzneimittel

Zur Anwendung bei Heranwachsenden ab 12 Jahren und Erwachsenen
Wirkstoff: Goldrutenkraut-Trockenextrakt

1. WAS IST SOLIDAGO STEINER® LÖSUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Solidago Steiner® Lösung ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der Harnwege.

Solidago Steiner® Lösung wird angewendet zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON SOLIDAGO STEINER® LÖSUNG BEACHTEN?

Solidago Steiner® Lösung darf nicht eingenommen werden

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Goldrutenkraut oder einen der sonstigen Bestandteile von Solidago Steiner® Lösung sind.

Keine Durchspülungstherapie bei Wasseransammlungen im Gewebe (Odemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nieren-tätigkeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Solidago Steiner® Lösung ist erforderlich

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage muss ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Solidago Steiner® Lösung soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Solidago Steiner® Lösung mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Solidago Steiner® Lösung soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei bestimmungsmäßigem Gebrauch sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Solidago Steiner® Lösung

Dieses Arzneimittel enthält Fructose. Bitte nehmen Sie Solidago Steiner® Lösung erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Hinweis für Diabetiker

Für Diabetiker geeignet.

5 ml = 0,28 g Fructose (0,023 BE). Mit der Tagesdosis (insgesamt 20 ml) werden 1,12 g Fructose (0,093 BE) aufgenommen.

3. WIE IST SOLIDAGO STEINER® LÖSUNG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Solidago Steiner® Lösung immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre nehmen 2–4 mal täglich 5 ml (Messbecher) Solidago Steiner® Lösung vor den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit ein.

Zur Abmessung der Milliliter wird so viel Flüssigkeit in den Messbecher gebracht, bis der Flüssigkeitsspiegel auf der Eichmarke für 5 ml liegt.

Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer ist nicht grundsätzlich begrenzt, richtet sich aber nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen. Beachten Sie in jedem Fall die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Solidago Steiner® Lösung ist erforderlich“ und „Nebenwirkungen“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Solidago Steiner® Lösung zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Solidago Steiner® Lösung eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen mit Solidago Steiner® Lösung sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Solidago Steiner® Lösung können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden möglicherweise verstärkt auftreten.

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn keine Beschwerden auftreten, kann die Behandlung mit der gewohnten Dosierung fortgesetzt werden.

Wenn Sie die Einnahme von Solidago Steiner® Lösung vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Solidago Steiner® Lösung abbrechen

Die Behandlung kann unterbrochen oder vorzeitig beendet werden, da das Absetzen in der Regel unbedenklich ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Solidago Steiner® Lösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Immunsystem:

Sehr selten:

Überempfindlichkeitsreaktionen (Juckreiz, Hautausschläge).

Magen-Darm-Trakt:

Sehr selten:

Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall).

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Solidago Steiner® Lösung nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST SOLIDAGO STEINER® LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Aus Pflanzen gewonnene Präparate neigen bei längerer Aufbewahrung, insbesondere bei Temperaturschwankungen, zu Trü-

bungen bzw. Ausflockungen, die jedoch ohne Einfluss auf die Wirksamkeit sind.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Nach Anbruch soll Solidago Steiner® Lösung nicht länger als 6 Monate verwendet werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Solidago Steiner® Lösung enthält:

Der Wirkstoff ist:

Trockenextrakt aus Goldrutenkraut (5-7:1).

100 g (100 g entspricht 90,9 ml) enthalten: 10 g Trockenextrakt aus Goldrutenkraut (5 – 7 : 1),

Auszugsmittel: Ethanol 50 % (m/m)

5 ml = ca. 3 g Droge.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Dinatriumhydrogenphosphat 12 H₂O, Propylenglycol, Glycerol 85 %, Fructose (Ph. Eur.), Acesulfam-Kalium, Neohesperidin-dihydrochalcon, Citronensäure-Monohydrat, Gereinigtes Wasser.

Wie Solidago Steiner® Lösung aussieht und Inhalt der Packung:

Die rötlich-braune bis braune dickflüssige Lösung ist in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz, Schraubkappe und Messbecher zu 100 ml (N1) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Steiner & Co.

Deutsche Arzneimittelgesellschaft mbH & Co. KG

Ostpreußendamm 72/74

12207 Berlin

Telefon +49 30 71094-0

Telefax +49 30 71250-12

E-mail: info@steinerarznei-berlin.de

Hersteller und Mitvertreiber

Pharma Wernigerode GmbH

Dornbergsweg 35

38855 Wernigerode

Telefon: +49 3943 554-0

Telefax: +49 3943 554-183

E-mail: info@pharma-wernigerode.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2009.

Zul.-Nr.: 6479497.00.01

Eigenschaften

Solidago Steiner® Lösung ist ein pflanzliches Arzneimittel aus Goldrutenkraut-Trockenextrakt. Dieser Extrakt wirkt harntreibend und entzündungshemmend.

Deshalb wird dieses Präparat zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege eingesetzt.

Achten Sie bei der Einnahme von Solidago Steiner® Lösung bitte auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Solidago Steiner® Lösung ist alkoholfrei.

Wir wünschen Ihnen
mit Solidago Steiner® Lösung gute Besserung!

STEINER
Arzneimittel

Pw
PHARMA
WERNIGERODE
GMBH

EAP050W

PGI004000/02PHW0609