



# Urokatt



## Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung:

In 1 Tablette sind verarbeitet:  
arzneilich wirksame Bestandteile:

Serenoa repens	ø 200,0 mg
Populus tremuloides (HAB 34) (HAB, Vorschrift 3a)	ø 50,0 mg

sonstige Bestandteile:

Lactose, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat

### Darreichungsform und Inhalt:

50, 100, 200 Tabletten zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwig GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der ableitenden Harnwege; Entleerungsstörungen der Harnblase.

Hinweis: Bei Blut im Urin, Fieber oder akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen:

keine bekannt

Zur Anwendung bei Kindern und in der Schwangerschaft und Stillzeit siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen 1 Tablette alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 12 mal täglich; bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Hinweis für den Fall der Überdosierung:**

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Patienten mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

**Nebenwirkungen:**

keine bekannt

Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** September 2002



Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn