

Pantederm® N HEXAL® 10 % Salbe

Wirkstoff: Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Pantederm® N HEXAL® 10 % Salbe jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pantederm® N HEXAL® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Pantederm® N HEXAL® beachten?
3. Wie ist Pantederm® N HEXAL® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pantederm® N HEXAL® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1 Was ist Pantederm® N HEXAL® und wofür wird es angewendet?

Pantederm® N HEXAL® ist eine Wund- und Heilsalbe.

Pantederm® N HEXAL® wird angewendet

zur Unterstützung der Wundheilung, auch bei nässenden oder juckenden Wunden, Schründen; Verwendung als Decksalbe.

2 Was müssen Sie vor der Anwendung von Pantederm® N HEXAL® beachten?

Pantederm® N HEXAL® darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zinkoxid, Wollwachsalkohole oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

Bei Anwendung von Pantederm® N HEXAL® mit anderen Arzneimitteln

Vor der Anwendung anderer, auf die Haut aufzutragender Mittel (z. B. Salben oder Cremes) ist Pante-

derm® N HEXAL® vollständig zu entfernen, da diese sonst nur eingeschränkt wirksam sind.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Daten zur Anwendung von Pantederm® N HEXAL® während der Schwangerschaft und der Stillzeit vor.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Pantederm® N HEXAL® hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Pantederm® N HEXAL®

Cetylstearylalkohol und Wollwachs können örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3 Wie ist Panteder[®] N HEXAL[®] anzuwenden?

Wenden Sie Panteder[®] N HEXAL[®] immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Panteder[®] N HEXAL[®] wird ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und mit Mull abgedeckt.

Art und Dauer der Anwendung

Bei Salbenverbänden: Wunde sorgfältig und schonend desinfizieren. Ausreichend Salbe auf eine Kompresse auftragen und auf die erkrankte Hautpartie legen. Verband nach Anweisung des Arztes, im Allgemeinen alle 24 Stunden, erneuern.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Panteder[®] N HEXAL[®] zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Panteder[®] N HEXAL[®] angewendet haben als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Panteder[®] N HEXAL[®] Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Auftragen von Panteder[®] N HEXAL[®] auf stark entzündete Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen

bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5 Wie ist Panteder[®] N HEXAL[®] aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Panteder[®] N HEXAL[®] fest verschlossen aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6 Weitere Informationen

Was Panteder[®] N HEXAL[®] enthält

Der Wirkstoff ist Zinkoxid.

1 g Salbe enthält 100 mg Zinkoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), weißes Vaseline, Wollwachsalkohole

Wie Panteder[®] N HEXAL[®] aussieht und Inhalt der Packung

Panteder[®] N HEXAL[®] ist eine weiße Salbe.

Panteder[®] N HEXAL[®] ist in Packungen mit 35 g und 100 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer HEXAL AG

Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
e-mail: service@hexal.com



Hersteller

Salutas Pharma GmbH
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2007.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!