2179-04

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, wie z.B. Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, setzen Sie Lymphozil® pro ab und informieren Sie sofort Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels
Lymphozil® pro soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

Stand der Information
Dezember 2008

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Patienteninformation

Lymphozil® pro ist ein pflanzliches Arzneimittel. Die wohlschmeckenden Tabletten sind **zahnfreundlich in der Anwendung**.

Lymphozil® pro zur Stärkung der körpereigenen Abwehr gegen Infekte **enthält keinen Zucker**. Patienten, die besonders auf ihre Zähne achten, brauchen bei der Einnahme von Lymphozil® pro deshalb keine Bedenken vor Karies zu haben.

Wie entsteht Karies?
Wann immer Bakterien, die als Belag (Plaque) auf dem Zahn sitzen, mit Zucker "gefüttert" werden, produziert deren Stoffwechsel Säure. Diese greift den Zahnschmelz an und begünstigt Karies. Für das Kariesrisiko ist nicht die Menge des Zuckers entscheidend, sondern die Häufigkeit des Verzehrs. Da Lymphozil® pro mehrmals täglich eingenommen wird, enthält dieses Arzneimittel keinen Zucker.

Mehr unter www.lymphozil.de

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Lymphozil® pro

cesra

12 mg
Wirkstoff: Echinacea-pallida-Wurzel-Trockenextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile
1 Tablette enthält:
Trockenextrakt aus
Echinacea-pallida-Wurzel (4–8:1) 12,0 mg
Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V)

Sonstige Bestandteile
Mannitol 60, Kakao, Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, Ascorbinsäure, Povidon 25, Stearinsäure, Talkum, Magnesiumstearat.

Darreichungsform und Inhalt
Lymphozil® pro erhalten Sie in Packungen mit 40 und 100 Tabletten.

Stoffgruppe / Wirkungsweise
Lymphozil® pro ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Hersteller / Pharmazeutischer Unternehmer
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221/9 54 00 · Fax: 07221/5 40 26 · eMail cesra@cesra.de

Anwendungsgebiete
Zur unterstützenden Therapie grippeartiger Infekte.

2179-04

2179-04

Gegenanzeigen

Wann sollten Sie Lymphozil® pro nicht einnehmen?

Bei Überempfindlichkeit gegen Echinacea pallidae radix (Echinacea-pallida-Wurzel) oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels oder gegen andere Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen Lymphozil® pro Tabletten nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Für Zubereitungen aus Echinacea-purpurea-Wurzel wurde festgestellt, dass diese die Aktivität bestimmter Enzyme (Cytochrom-P450-Isoformen CYP3A oder CYP1A2) beeinflussen.

Das vorliegende Arzneimittel mit der Zubereitung aus Echinacea-pallida-Wurzel ist dahingehend nicht ausreichend untersucht.

Bitte fragen Sie deshalb Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, nach der Möglichkeit einer solchen Beeinflussung.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lymphozil® pro nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Lymphozil® pro sonst nicht richtig wirken kann!

In welcher Menge und wie oft sollten Sie Lymphozil® pro einnehmen?

Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre nehmen 4 mal täglich 2 Tabletten Lymphozil® pro mit ausreichend Flüssigkeit ein.

Die Einzeldosis entspricht 144 mg Droge.

Wie lange sollten Sie Lymphozil® pro einnehmen?

Lymphozil® pro sollte nicht länger als 2 Wochen ununterbrochen angewendet werden. In diesem Zeitraum ist die gewünschte Wirkung zu erwarten. Bei Bedarf empfiehlt es sich, die Therapie in Intervallen zu wiederholen.

Worauf sollten Sie noch achten?

Hinweis für Diabetiker: 1 Lymphozil® pro Tablette enthält 0,23 g Kohlehydrate (0,02 BE).

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu beachten, wenn Lymphozil® pro in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigt oder versehentlich)?

Für Zubereitungen aus Echinacea-pallida-Wurzel sind bisher keine Vergiftungserscheinungen bekannt. Wenn Sie eine größere Menge von Lymphozil® pro eingenommen haben, als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Was ist zu beachten, wenn Sie zu wenig Lymphozil® pro angewendet oder eine Anwendung vergessen haben:

Wenn Sie zuwenig von Lymphozil® pro genommen haben oder die Einnahme von Lymphozil® pro vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Lymphozil® pro auftreten?

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	**Häufig:** weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten	**Selten:** weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

2179-04