

Oligoplexe® Madaus

Silicea S Oligoplex®[Drucken](#)

Kieselsäure (PZN: 03673662)

Zusammensetzung:**1 Tablette enthält:**

Silicea Trit. D 3

Arnica Trit. D 3

Calcium fluoratum Trit. D 4

Stibium sulfuratum nigrum Trit. D 4

Thuja Trit. D 3

aa 50,0 mg

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht / *Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus*:

Chronische Entzündungen, Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Schleimhäute, der Knochen und Gelenke; Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke; Gewebewucherungen.*Zur Aktivierung des Bindegewebes.*

Blutungen aller Art; Myalgie nach Überlastung; Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.*Furunkulose.*

Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe.*Bindegewebsschwäche.*

Hauterkrankungen.*Haut- und Schleimhautreaktionen bei exsudativer Diathese, chronische Ekzeme, Hyperkeratosen, Rhagaden.*

Haut- und Schleimhauterkrankungen.*Chronisch-eitrig, auch proliferierende Haut- und Schleimhautleiden.*

Anwendungsgebiet:

Zur unterstützenden Behandlung bei Bindegewebsschwäche und bei lokal begrenzten Hautentzündungen.

Dosierung:

1-3mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden Reduzierung der Häufigkeit der Anwendung.

Gegenanzeigen:

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler, Säuglingen und Kleinkindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Silicea S Oligoplex® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Geben Sie Silicea S Oligoplex®

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Kindern von 6 bis 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

<< Zurück