

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Heparin-ratiopharm® Sport-Gel

Gel

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Gel enthalten:

Heparin-Natrium (aus Schweinedarmmukosa) 60 000 I.E. entspr. 0,354 g (0,333–0,375 g)

Aktivität: mind. 160 I.E./mg; max. 180 I.E./mg

Sonstige Bestandteile:

Carbomer 980, Poly(oxyethylen)-36-Rizinusöl, Propan-2-ol, Parfümöl Rosmarin, Latschenkiefernöl, gereinigtes Wasser, Trometamol.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 50 g Gel

Originalpackung mit 100 g Gel

Originalpackung mit 150 g Gel

Stoff- oder Indikationsgruppe

Zur Verminderung von Schwellungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30

Hersteller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei

- akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen, Blutergüssen)
- oberflächlicher Venenentzündung, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden kann

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Heparin-ratiopharm® Sport-Gel nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Heparin-ratiopharm® Sport-Gel soll dieses Arzneimittel nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben. Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Heparin-ratiopharm® Sport-Gel soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

Hinweis:

Bei sehr großflächiger Anwendung und gleichzeitiger Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Mitteln (Antikoagulanzen, Acetylsalicylsäure) kann die Blutungsneigung verstärkt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Heparin-ratiopharm® Sport-Gel, oder werden selbst durch Heparin-ratiopharm® Sport-Gel in ihrer Wirkung beeinflusst? Was müssen Sie gegebenenfalls beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt (siehe auch „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Heparin-ratiopharm® Sport-Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Heparin-ratiopharm® Sport-Gel sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Heparin-ratiopharm® Sport-Gel und wie oft sollten Sie Heparin-ratiopharm® Sport-Gel anwenden?

Heparin-ratiopharm® Sport-Gel soll 2–3 mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Wie lange sollten Sie Heparin-ratiopharm® Sport-Gel anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Heparin-ratiopharm® Sport-Gel ca. 1–2 Wochen anwenden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Heparin-ratiopharm® Sport-Gel in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Überdosierungserscheinungen bekannt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Heparin-ratiopharm® Sport-Gel auftreten?

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind sehr selten. Jedoch können in Einzelfällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Heparin-ratiopharm® Sport-Gel sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Anbruch der Tube:

Dieses Arzneimittel ist nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Wie ist Heparin-ratiopharm® Sport-Gel aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern!

Stand der Information

September 2006

Achten Sie stets darauf, Heparin-ratiopharm® Sport-Gel so aufzubewahren, daß dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!
