

**Natürliches Medizinprodukt zur Entgiftung des Verdauungstraktes und Entlastung der Leber**

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS dient der Prävention, Therapie und Therapiebegleitung von Krankheiten. Die Wirkung beruht auf der besonderen Eigenschaft, schädliche Stoffe bereits im Verdauungstrakt zu binden. Die Leber als wichtigstes Entgiftungsorgan kann so wirksam entlastet werden. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS bietet die volle Entgiftungsleistung von FROXIMUN® mit dem Plus an Calcium und Magnesium. Als Pulver angewendet, entfaltet es bereits ab dem oberen Verdauungstrakt seine Wirkung.

**1. Dosierung und Dauer der Anwendung**

- Falls von Ihrem Arzt oder Therapeuten nicht anders verordnet, vermischen Sie 1-2 mal pro Tag den Inhalt eines Stickbeutels in ausreichend Flüssigkeit (bspw. einem Glas mit 0,3 l stillem Wasser oder grünem Tee) und trinken Sie diese Mischung vor einer Hauptmahlzeit.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tageseinnahme von 2 Stickbeuteln, ohne Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten konsultiert zu haben.
- Diese Packung deckt den Bedarf für ca. 30 Tage.
- Insofern nicht anders durch Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten verordnet, ist nach einer ununterbrochenen Anwendungsdauer von 28 Tagen eine Anwendungspause von mind. 2 Tagen einzuhalten, bevor die Anwendung wiederholt werden kann.
- Öffnen Sie erst unmittelbar vor der Anwendung die Stickbeutel und schütten Sie den Inhalt unmittelbar in die Flüssigkeit zum Verühren. Entnehmen Sie immer nur die Menge an Stickbeuteln aus der Faltschachtel, wie Sie zum Zeitpunkt der Entnahme anwenden möchten.

**2. Anwendungsbereiche**

- Bindung von Ammonium
- Bindung der Schwermetalle Blei und Quecksilber
- Bindung von Histamin und anderen Aminen, z.B. Dimethylamin zur Reduzierung der Bildung von Nitrosaminen
- essenzielle Stoffe wie z.B. Zink, Eisen werden nachweislich nicht gebunden und bleiben dem Organismus erhalten

**3. Bitte beachten Sie**

- Während der Schwangerschaft, dem Stillen oder bei einem medizinischen Problem, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.
- Nicht zeitgleich mit Medikamenten anwenden: Warten Sie mind. 60 Minuten nach der Einnahme von Medikamenten, bevor Sie FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS anwenden.

**4. Lagerung und Verwendbarkeit**

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und bei unter 60°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- verwendbar bis siehe Boden der Faltschachtel oder Prägung/Druck auf dem Stickbeutel

**5. Inhaltstoffe**

- 1 Stickbeutel enthält 3000 mg Pulver bestehend aus MANC (Clinoptilolith), Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat

**Gehalt an Mineralstoffen (GDA\*):**

Mineral	je Stickbeutel à 3 g	je 2 Stickbeutel à 3 g
Calcium	27 %	54 %
Magnesium	21 %	42 %

\* GDA, Anteil an der empfohlenen Tagesmenge

**6. MedizinproduktHersteller**

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199  
eMail: anwender@froximun.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 06.10.2010

**Natural medical product for detoxification of the intestinal tract and liver relief**

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS is used in the prevention, treatment and treatment accompaniment of illness. Its effect is based on its special property of already binding hazardous substances in the intestinal tract. The liver as the most important detoxification organ can thus be effectively relieved. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS provides the full detoxification strength of FROXIMUN® plus calcium and magnesium. Taken as a powder, it starts working as soon as it enters the upper intestinal tract.

**1. Dosage and duration of use**

- Unless otherwise prescribed by your physician or therapist, take the contents of one stick bag mixed with plenty of liquid (e.g. a glass with 300 ml of still water or green tea) once or twice daily before a main meal.
- Do not exceed the specified daily dose of 2 stick bags without having consulted your physician, naturopath or therapist.
- This pack covers the requirement of approx. 30 days.
- A break of at least 2 days is required after uninterrupted use of 28 days before the treatment is repeated, unless otherwise prescribed by your physician, naturopath or therapist.
- Only open the stick bags immediately before use and shake the contents in the liquid to stir. Only remove the number of stick bags from the folding box that you require for immediate use.

**2. Application areas**

- Binding of ammonium
- Binding of the heavy metals lead and mercury
- Binding of histamines and other amines, e.g. dimethylamine for the reduction of nitrosamine formation
- Essential substances such as zinc and iron are demonstrably not bound and remain intact

**3. Please note**

- Please consult your physician before using FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS during pregnancy, when breast-feeding or if you have a medical problem.
- Stop taking the product if you notice any unusual effects.
- Do not take simultaneously with other medication: wait at least 60 minutes after taking medication before using FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

**4. Storage and usability**

- keep out of reach of children
- store in a dry place below 60°C
- protect from direct sunlight
- for use by date see bottom of folding box or stamp/imprint on the stick bag

**5. Ingredients**

- 1 stick bag contains 3,000 mg of powder consisting of MANC (clinoptilolite), calcium carbonate and magnesium carbonate

**Mineral content (GDA\*):**

Mineral	per 3 g stick bag	per 2 x 3 g stick bags
Calcium	27%	54%
Magnesium	21%	42%

\* GDA = Guideline Daily Amount

**6. Medical product manufacturer**

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199  
e-mail: anwender@froximun.de

These instructions were last updated on: 2010-10-06

**Médicament naturel visant à la détoxification du tube digestif et au soulagement du foie**

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS sert à la prévention, à la thérapie et à l'accompagnement thérapeutique de diverses pathologies. L'effet repose sur la qualité particulière à lier des substances nocives déjà présentes dans le tube digestif. Le foie, le plus important organe d'épuration, peut en conséquence être largement soulagé dans sa tâche. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS offre les propriétés d'épuration du produit médical FROXIMUN®, enrichies de calcium et de magnésium. Administré sous forme pulvérisée, il opère dès l'ingestion sur le tube digestif supérieur.

**1. Posologie et durée de traitement**

- Sauf avis contraire de votre médecin ou thérapeute, diluez une à deux fois par jour le contenu d'un sachet dans au moins 300 ml d'eau plate ou de thé vert et buvez la solution avant un repas.
- Ne dépassez pas la dose prescrite de 2 sachets par jour sans consultation de votre médecin, praticien de santé ou thérapeute.
- Cette boîte couvre les besoins d'un traitement d'environ 30 jours.
- Sauf avis contraire de votre médecin, praticien de santé ou thérapeute, après un traitement non interrompu de 28 jours, il convient de respecter une pause de 2 jours avant de reprendre le traitement.
- N'ouvrez le sachet qu'immédiatement avant l'usage et mélangez directement le contenu dans la dose de liquide prescrite. Ne retirez de la boîte que le nombre de sachets nécessaires à chaque prise.

**2. Champs d'application**

- Liaison de l'ammonium
- Liaison des métaux lourds plomb et mercure
- Liaison de l'histamine et autres amines (diméthylamine, par exemple) pour la réduction de la formation de nitrosamines
- Les substances essentielles telles que le zinc ou le fer ne sont manifestement pas liées et sont conservées par l'organisme

**3. Mises en garde spéciales**

- En cas de grossesse, d'allaitement ou de traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant toute prise de FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Arrêtez la prise en cas de troubles.
- Interactions médicamenteuses : attendez au moins 60 minutes après la prise de médicaments pour prendre FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

**4. Stockage et conservation**

- Tenir hors de portée des enfants
- Conserver au sec (température inférieure à 60 °C)
- et à l'abri de la lumière
- Valable jusqu'à : voir la date de péremption sur le fond de la boîte ou sur l'impression apposée sur le sachet

**5. Contenu et composition**

- 1 sachet contient 3000 mg de poudre composée de clinoptilolite, de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium

**Teneur en minéraux (AJR\*):**

Minéral	pour un sachet de 3 g	pour 2 sachets de 3 g
Calcium	27 %	54 %
Magnésium	21 %	42 %

\* AJR, Apport Journalier Recommandé

**6. Fabricant de produits médicaux**

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Téléphone : +49 39401 632-0, Fax : +49 39401 632-199  
Adresse e-mail : anwender@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice : 2010-10-06

**Prodotto medicinale naturale per la disintossicazione del tratto digerente e il supporto della funzionalità epatica.**

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS prevenzione, terapia e ausilio terapeutico in caso di malattie. La sua azione si basa sulla particolare proprietà di legare le sostanze nocive già a livello del tratto intestinale, riuscendo così a decongestionare efficacemente il fegato, il più importante organo preposto alla disintossicazione. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS svolge la stessa funzione disintossicante di FROXIMUN® fornendo in più un apporto di calcio e magnesio. Somministrato sotto forma di polvere, svolge la sua azione già nel primo tratto digerente.

**1. Dosaggio e durata della somministrazione**

- Se non prescritto diversamente dal medico o dal terapeuta, assumere 1-2 volte al giorno il contenuto di una bustina in abbondante acqua (ad es. un bicchiere da 0,3 litri di acqua non gasata o tè verde) prima dei pasti principali.
- Non assumere più di 2 bustine al giorno senza consultare prima il medico, il naturopata o il terapeuta.
- Il contenuto di questa confezione è sufficiente per un trattamento di circa 30 giorni.
- Se non prescritto diversamente dal medico, naturopata o terapeuta, al termine di un ciclo ininterrotto di assunzione di 28 giorni sospendere per almeno 2 giorni prima di ripetere un nuovo ciclo di assunzione.
- Aprire la bustina appena prima dell'utilizzo, versare il contenuto in un bicchiere di liquido e mescolare bene. Prelevare dalla confezione solo le bustine che si intendono assumere.

**2. Applicazioni**

- Legame di ammonio
- Legame dei metalli pesanti piombo e mercurio
- Legame di istamina e altre ammine, ad es. dimetilammina, per ridurre la formazione di nitrosammine
- Sostanze essenziali, ad es. zinco e ferro, non vengono legate e restano a disposizione dell'organismo

**3. Precauzioni**

- In gravidanza, durante l'allattamento o in caso di problemi di salute, consultare il medico prima di assumere FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Interrompere l'assunzione qualora si riscontrino l'insorgere di un effetto insolito.
- Non assumere contemporaneamente ad altri farmaci: attendere almeno 60 minuti dopo l'assunzione dell'altro farmaco, prima di assumere FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

**4. Conservazione e utilizzabilità**

- Conservare lontano dalla portata dei bambini
- Conservare in un luogo asciutto a temperatura inferiore a 60°C
- Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare
- Utilizzabile entro la data di scadenza indicata in basso sulla confezione o stampata sulla bustina.

**5. Ingredienti**

- 1 bustina contiene 3000 mg di polvere composta da MANC (clinoptilolite), carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

**Contenuto di minerali (GDA\*):**

minerali	per ogni bustina da 3 g	per 2 bustine da 3 g
Calcio	27 %	54 %
Magnesio	21 %	42 %

\* GDA ragione giornaliera consigliata

**6. Produttore del prodotto medicinale**

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Telefono: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199  
e-mail: anwender@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l'uso: 2010-10-06

### Producto de medicina natural para la limpieza del tracto gastrointestinal y la desintoxicación del hígado.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS sirve para la prevención, el tratamiento o los tratamientos coadyuvantes de enfermedades. Su principal efecto es la neutralización de materias dañinas que ya se encuentran en el tracto digestivo. Este proceso puede llevarse a cabo de forma eficaz y conservar el hígado como el principal órgano de desintoxicación.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ofrece toda la capacidad de desintoxicación de FROXIMUN® con el plus del calcio y el magnesio. Al aplicarse en polvo, empieza a hacer efecto desde el tracto gastrointestinal superior.

#### 1. Dosificación y duración del tratamiento

- En caso de que el médico o el terapeuta no le haya recetado otro tratamiento, mezcle el contenido de un sobre con líquido suficiente (por ejemplo un vaso de 30 cl de agua mineral o té verde) y beba la mezcla antes de las comidas principales una o dos veces al día.
- No tome más de dos sobres al día sin haber consultado a su médico, homeópata o terapeuta.
- Este paquete le abastece para 30 días aproximadamente.
- En este sentido, si su médico, homeópata o terapeuta no le ha recetado otro tratamiento, tras haber tomado las cápsulas ininterrumpidamente durante 28 días, es necesario realizar una pausa de al menos 2 días antes de volver a tomarlos.
- Abra los sobres inmediatamente antes de tomarlos y vierta el contenido enseguida en el líquido para mezclarlos. Saque de la caja sólo la cantidad de sobres que vaya a tomar en ese momento.

#### 2. Ámbitos de aplicación

- Enlace de amonio.
- Enlace de plomo pesado y mercurio.
- Enlace de histamina y otras aminas (por ejemplo, dimetilamina para la reducción de la formación de nitrosaminas).
- Materiales esenciales, (por ejemplo, cinc y hierro) que no se unen y permanecen en el organismo.

#### 3. Atención

- Durante el embarazo, la lactancia o si tiene problemas médicos, consulte a su médico antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Interrumpa el tratamiento si percibe efectos inesperados.
- No tome simultáneamente con medicamentos: deje pasar al menos 60 minutos tras la ingesta de medicamentos, antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

#### 4. Conservación y fecha de caducidad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar seco y a menos de 60 °C.
- Proteger de la exposición directa del sol.
- Consumir antes de la fecha indicada
- en la parte inferior de la caja o impresa/estampada en el sobre.

#### 5. Contenido

- Un sobre contiene 3.000 mg de polvo compuesto por clinoptilolito natural, activo
- y modificado (MANC), carbonato de calcio y carbonato de magnesio

##### Contenido de minerales (CDR\*):

Mineral	por cada sobre de 3 g	por cada dos sobres de 3 g
Calcio	27 %	54 %
Magnesio	21 %	42 %

\* CDR: cantidad diaria recomendada

#### 6. Fabricante de productos médicos

Froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Teléfono: +49 39401 632-0. Fax: +49 39401 632-199  
Correo electrónico: anwender@froximun.de

Fecha de la última actualización de esta información: 2010-10-06

### Produto medicinal natural para desintoxicação do tracto intestinal e neutralização do fígado

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS é usado na prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças. A sua principal característica é a neutralização de substâncias nocivas no aparelho digestivo. Esta neutralização protege eficazmente o fígado, como um importante órgão de desintoxicação.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS oferece total poder de desintoxicação de FROXIMUN®, com cálcio e magnésio. Administrado em pó, começa a agir já na parte superior do tracto intestinal.

#### 1. Dosagem e duração de utilização

- Salvo outra prescrição por parte do seu médico ou terapeuta, dissolva o conteúdo de uma saqueta em líquido suficiente (p. ex. um copo com 300 mL de água ou chá verde) e beba a mistura de 1 a 2 vezes por dia, antes das refeições.
- Não ultrapasse a ingestão sugerida de 2 saquetas por dia sem antes consultar o seu médico, farmacêutico ou terapeuta.
- O conteúdo desta embalagem é suficiente para 30 dias de uso.
- Salvo outra prescrição por parte do seu médico, farmacêutico ou terapeuta, após uma utilização contínua de 28 dias, é necessário efectuar uma pausa de, pelo menos, 2 dias, antes de retomar a utilização.
- Abra apenas a saqueta antes da utilização e misture de imediato o conteúdo em meio líquido. Somente retire da caixa as saquetas necessárias no momento da utilização.

#### 2. Áreas de aplicação

- Composto de amónio
- Composto de metais pesados: chumbo e mercúrio
- Composto de histamina e outras aminas, por exemplo, dimetilamina para a redução da formação de nitrosaminas
- As substâncias essenciais como, por ex., zinco e ferro não são comprovadamente compostas, e são mantidas no organismo

#### 3. Tenha em atenção

- Consulte seu médico antes de usar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS durante a gravidez, a lactação ou em caso de algum problema médico.
- Em caso de sintomas incomuns, termine a utilização.
- Não utilize com outros medicamentos: após a ingestão de medicamentos, espere pelo menos 60 minutos antes de utilizar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

#### 4. Armazenamento e prazo de validade

- Manter fora do alcance das crianças
- Guardar num local seco e com uma temperatura inferior a 60°C
- Proteger da radiação solar directa
- Utilizar até: ver fundo da caixa ou relevo/impressão na saqueta

#### 5. Composição

- 1 saqueta contém 3.000 mg de pó composto de MANC (clinoptilolito), carbonato de cálcio e carbonato de magnésio

##### Concentração de minerais (IDR\*)

Minerais	cada saqueta de 3g	cada 2 saquetas de 3g
Cálcio	27 %	54 %
Magnésio	21 %	42 %

\*IDR, Ingestão Diária Recomendada

#### 6. Fabricante do medicamento

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Telefone: +49 39401 632-0. Fax: +49 39401 632-199  
E-mail: anwender@froximun.de

Data da última revisão destas indicações de utilização: 2010-10-06

### Sindirim borusuna detoksikasyon uygulamak ve karaciğer yükünü hafifletmek için doğal tıbbi ürün

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve ek tedavisi için kullanılır. Zararlı maddeleri sindirim borusunda bağlama özelliğinden dolayı etkilidir. Böylece en önemli detoksikasyon organı olan karaciğerin yükü hafifletilmiş olur.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS kalsiyum ve manyezyum ilavesiyle FROXIMUN® ürününün detoksikasyon etkisini sunar. Toz olarak kullanıldığında üst sindirim borusundan itibaren etkisini gösterir.

#### 1. Kullanım süresi ve dozu

- Hekim veya terapist tarafından başka türlü verilmemesi durumunda, günde 1-2 kez bir stick torbasının içeriğini yeterli sıvı (örn. bir bardakta 0,3 l durgun su veya yeşil çay) içinde karıştırın ve bu karışımı bir ana yemekten önce için.
- Doktorunuza, bitki hekiminize veya terapistinize danışmadan belirtilen günlük toplam 2 stick torba dozu aşmayın.
- Bu paket, yakl. 30 günlük ihtiyacınızı karşılar.
- Bu nedenle, doktorunuz, bitki hekiminiz veya terapistiniz aksini belirtmedikçe, kapsüller 28 gün süresince devamlı aldıktan sonra onları almaya devam etmeden önce, en az 2 günlük bir kullanım arası verilmelidir.
- Stick torba doğru şekilde kullanımdan önce açılmalı ve içeriği doğrudan karıştırılmak üzere sıvının içine dökülmelidir. Katlanabilir ambalajdan sadece o anda kullanacağınız miktarda stick torba çıkartın.

#### 2. Kullanım alanları

- Amonyum bağlama
- Kürsün ve cıva gibi ağır metalleri bağlama
- Histamin ve diğer aminleri bağlama, örn. nitrosaminlerin oluşumunu azaltmak için dimetilamin
- Çinko ve demir gibi önemli maddeler bağlanmaz ve vücutta kalır

#### 3. Lütfen dikkate alın

- Gebelikte, emzirirken veya tıbbi bir sorununuz olduğunda FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ürünü kullanmadan önce doktorunuza başvurun.
- Sıra dışı bir etki görürseniz tedaviyi sonlandırın.
- Başka ilaçlarla birlikte almayınız: Başka ilaç aldıktan sonra en az 60 dakika beledikten sonra FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ürünü kullanın.

#### 4. Saklama koşulları ve kullanılabilirlik

- çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın
- kuru ve 60°C'nin altında saklayın
- doğrudan güneş ışınlarından koruyun
- son kullanım tarihini görmek için katlanır ambalajın altına veya stick torba kenarındaki baskıya bakın

#### 5. İçindeki maddeler

- 1 stick torba MANC (Clinoptilolith), kalsiyum karbonat ve manyezyum karbonattan oluşan 3000 mg toz içerir

##### Mineral madde içeriği (GDA\*):

Mineral	3 g her stick torbada	3 g her stick torbada
kalsiyum	% 27	% 54
manyezyum	% 21	% 42

\* GDA, önerilen günlük miktar oranı

#### 6. İmalatçı

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199  
e-posta: anwender@froximun.de

Bu kullanım bilgilerinin en son düzenlendiği tarih: 2010-10-06

### Натуральный медицинский продукт для детоксикации кишечного тракта и разгрузки печени

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS предназначен для предупреждения, лечения и сопровождения лечения различных заболеваний. Действие основано на способности связывать вредные вещества уже в пищеварительном тракте. Таким образом, можно эффективно снизить нагрузку на печень, как на важнейший орган, отвечающий за вывод токсинов из организма.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS обеспечивает полную эффективность детоксикации препарата FROXIMUN® с добавлением кальция и магния. Применяемый в виде порошка, он начинает действовать в верхнем отделе кишечного тракта.

#### 1. Дозировка и длительность применения

- Если Вашим врачом или терапевтом не предписано иначе, принимайте препарат 1-2 раза в день перед приемом пищи, предварительно растворив содержимое стик-пакета в достаточном количестве жидкости (напр. в стакане с 0,3 л негазированной воды или зеленого чая).
- Не превышайте указанную дневную дозу 2 стик-пакетов, не проконсультировавшись с Вашим врачом или терапевтом.
- Содержимого этой упаковки должно хватить примерно на 30 дней.
- Если Вашим врачом или терапевтом не предписано иначе, после 28 дней непрерывного применения следует сделать перерыв не менее чем на 2 дня, прежде чем возобновить прием препарата.
- Откройте стик-пакет непосредственно перед приемом, всыпьте содержимое в жидкость и размешайте. Извлекайте из упаковки только то количество стик-пакетов, которое Вы намерены в этот момент принять.

#### 2. Области применения

- Связывание аммония
- Связывание тяжелых металлов (свинец и ртуть)
- Связывание гистамина и других аминов, например, диметилamina, для уменьшения образования нитрозаминов
- При этом, как было доказано, жизненно важные элементы, как, например, цинк и железо не связываются и остаются в организме

#### 3. Пожалуйста, учтите следующее

- В период беременности и лактации или при наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем ПРИНИМАТЬ FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Прекратите применение, если Вы заметите какое-либо необычное действие препарата на Вас.
- Не принимайте одновременно с лекарственными препаратами: Выждите не менее одного часа после приема лекарства, прежде чем ПРИНИМАТЬ FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

#### 4. Хранение и срок годности

- Хранить в недоступном для детей месте
- В сухом месте при температуре не выше 60°C
- В месте, защищенном от прямых солнечных лучей
- Годен до: см. дату на нижней стороне картонной упаковки или дату, выбитую/напечатанную на стик-пакете.

#### 5. Составные части

- 1 стик-пакет содержит 3000 мг порошка, состоящего из MANC (клиноптилолит), карбоната кальция и карбоната магния.

##### Содержание минеральных веществ (GDA\*):

Минералов	на стик-пакет 3 г	на 2 стик-пакета 3 г
Кальций	27 %	54 %
Магний	21 %	42 %

\* GDA - процент от рекомендуемой дневной дозы

#### 6. Производитель медицинского изделия

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Telefon: +49 39401 632-0, телефакс: +49 39401 632-199  
Эл. адрес: anwender@froximun.de

Эта информация по применению в последний раз была обновлена: 2010-10-06