



LIPOMYST

Gebrauchsanweisung

Opticalm Lipomyst ist ein konservierungsmittelfreies Lidspray zur Behandlung müder und trockener Augen.

Zusammensetzung

| Inhaltsstoffe | 1 ml enthält: |
|--------------------|---------------|
| Sojalecithin | 10 mg |
| Natriumchlorid | 2,8 mg |
| Ethanol | 8 mg |
| Vitamin A-Palmitat | 0,25 mg |
| Vitamin E | 0,02 mg |
| Gereinigtes Wasser | |

Anwendungsgebiete

Opticalm Lipomyst stabilisiert die Lipidschicht, welche die Verdunstung des Tränenfilms vermeidet und so für die Erhaltung der natürlichen Tränenflüssigkeit sorgt. Augenoberfläche und Augenlider werden befeuchtet. **Opticalm Lipomyst** kann zur Linderung müder, trockener, gereizter oder tränender Augen angewendet werden.

Wie Opticalm Lipomyst wirkt

Die Tränenflüssigkeit hat für das Auge eine sehr wichtige Schutz- und Ernährungsfunktion. Sie beeinflusst somit entscheidend Gesundheit und Wohlbefinden.

Der natürliche Tränenfilm besteht aus 3 Schichten; der inneren Muzin-Schicht, die die Oberfläche des Auges bedeckt, der wässrigen Schicht, die das Auge schützt und ernährt und der äußeren Lipidschicht, die die Verdunstung der Tränen vom Auge vermindert.

Viele äußere Einflüsse des modernen Lebensstils wie langes Arbeiten am Bildschirm/Computer, Autofahren, Heizungsluft oder Klimaanlage, Luftverschmutzung u.v.m. können die schützende Lipidschicht schädigen, was zu einer erhöhten Verdunstung der Tränenflüssigkeit und somit zu trockenen Augen führt.

Opticalm Lipomyst lindert die Symptome müder und trockener Augen schnell durch Aufbau und Stabilisierung der beschädigten Lipidschicht. Die umliegende Augenregion wird befeuchtet.

Opticalm Lipomyst wirkt durch eine neuartige Kolloidtechnologie:

- Das Augenspray verteilt Kolloide aus Phospholipiden auf den Augenlidern.
- Die Phospholipide ersetzen die natürlichen Lipide und stabilisieren so den Lipidfilm.

Anwendungshinweise

Bei der ersten Anwendung sind 3 bis 4 Pumpstöße erforderlich, um die Pumpvorrichtung zu füllen. Drücken Sie dazu 3 bis 4-mal kräftig auf den Sprühkopf, um den Gebrauch des Produkts möglich zu machen.

Sprühen Sie **Opticalm Lipomyst** 1 bis 2-mal auf die geschlossenen Augenlider. Halten Sie dabei einen Sprühabstand von ca. 10 cm ein. Sprühen Sie das Produkt nicht in die geöffneten Augen und berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit dem Sprühkopf.

In der Regel sind 3 bis 4 Anwendungen am Tag ausreichend, um eine Linderung zu erzielen. Bei schwerer ausgeprägten Symptomen kann das Augenspray häufiger angewendet werden.

Opticalm Lipomyst kann in der Langzeitanwendung täglich angewendet werden.

Der neuartige Sprühkopf filtert die eintretende Luft aseptisch und verhindert so eine Verunreinigung.

Opticalm Lipomyst ist deshalb absolut konservierungsmittelfrei.

| Was Sie machen sollten! | Was passiert? |
|--|---|
| 1. Sprühen Sie 1 bis 2-mal auf die geschlossenen Augenlider und halten Sie einen Sprühabstand von ca. 10 cm zwischen Spray und geschlossenem Auge ein. | <ul style="list-style-type: none">• Kolloide (Phospholipide) verteilen sich über die Augenlider.• Phospholipide ergänzen die natürlichen Lipide. |
| 2. Blinzeln | <ul style="list-style-type: none">• Lipide werden durch die Blinzelnbewegung auf der Augenoberfläche verteilt und bauen die Lipidschicht wieder auf.• Kolloide ziehen schnell in die umliegende Augenregion ein. |
| 3. Augen geöffnet | <ul style="list-style-type: none">• Beruhigendes, erfrischendes Gefühl.• Linderung der Symptome trockener Augen. |

Das Produkt sollte nicht in die geöffneten Augen gesprüht werden. Passiert dies dennoch unabsichtlich, kann ein kurzes, brennendes Gefühl auftreten.

Kann auch beim Tragen von Kontaktlinsen und auf Make-up angewendet werden:

- Benutzen Sie **Opticalm Lipomyst**, bevor Sie Make-up auftragen oder nach dem Abschminken. Bei Anwendung von bereits aufgetragenem Make-up sollte nur ein Sprühstoß verwendet werden. Der Sprühabstand zwischen Spray und Auge sollte erhöht werden (ca. 20 cm).
- Durch die Stabilisierung des Tränenfilms mit **Opticalm Lipomyst** wird das Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen angenehmer.

Gegenanzeigen

 Verwenden Sie **Opticalm Lipomyst** nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Aufbewahrung

5°C  25°C Kühl und trocken lagern.

 Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach dem ersten Gebrauch kann die Flasche noch 6 Monate verwendet werden – im Gegensatz zu anderen Augentropfen muss **Opticalm Lipomyst** nicht nach 28 Tagen entsorgt werden.
- Um einen stärker erfrischenden Effekt zu erzielen, kann **Opticalm Lipomyst** im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Nicht nach dem hinter "Verwendbar bis" angegebenen Verfallsdatum anwenden.

Hinweise zur Anwendung

Da bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Verunreinigung erfolgt, kann die Augensprayflasche von mehreren Personen benutzt werden. Wenn Ihnen Augenpräparate verschrieben worden sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie **Opticalm Lipomyst** anwenden.

Opticalm Lipomyst ist nicht geeignet, um ansteckende Augenerkrankungen (verursacht durch Bakterien, Viren oder Pilze) zu behandeln oder im Falle von Verletzungen oder Verbrennungen der Augenoberfläche.

Benutzen Sie **Opticalm Lipomyst** nicht, wenn die Sprayflasche beschädigt ist.

Opticalm Lipomyst weist einen leichten Geruch nach natürlichem Lecithin (Phospholipiden) auf, der nach dem Auftragen sehr schnell verschwindet.

Hersteller:

Medena AG
Industriestrasse 16
CH – 8910 Affoltern am Albis

Vertrieb DE:

Deutsche Chefaro Pharma GmbH
D-40476 Düsseldorf
Deutschland

Vertrieb AT:

Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57
1030 Wien
Österreich

CE 1253 - e 10 ml

STERILE A

Datum der letzten Überarbeitung: 06/2012

Die Deutsche Chefaro Pharma GmbH und die Richard Bittner AG sind Tochterunternehmen der Omega Pharma N.V.