

## **Liebe Patientin, lieber Patient !**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Gebrauchsinformation**

# **Gluko-cyl<sup>®</sup> N**

## **Ho-Len-Complex<sup>®</sup>**

### **Homöopathisches Arzneimittel**

#### **Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 10,8 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Phenolum [HAB, Vorschrift 5a; Lösung D2 mit Ethanol 43% (m/m)] Dil. D10	1,50 g
Arsenicum album Dil. D6	1,50 g
Kreosotum Dil. D10	1,50 g
Natrium sulfuricum Dil. D6	1,25 g
Secale cornutum Dil. D6	1,25 g
Syzygium jambolanum Dil. D2	1,50 g

Sonstiger Bestandteil:

Ethanol 30% (m/m)

1 ml entspricht 21 Tropfen

#### **Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

#### **Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**



#### **Pharma Liebermann GmbH**

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073) 9 58 93-0

Telefax: (09073) 9 58 93-55

#### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### **Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie Gluko-cyl<sup>®</sup> N Ho-Len-Complex<sup>®</sup> nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

Wann dürfen Sie Gluko-cyl<sup>®</sup> N Ho-Len-Complex<sup>®</sup> erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Gluko-cyl<sup>®</sup> N Ho-Len-Complex<sup>®</sup> nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

### **Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Warnhinweis:**

Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® enthält 51 Vol.% Alkohol!

### **Wechselwirkungen**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® nicht richtig wirken kann!

### **Wieviel und wie oft sollten Sie Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Wie und wann sollten Sie Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® anwenden?**

Die Tropfen sollte man am besten mit wenig Wasser einnehmen und im Mund zergehen lassen.

### **Wie lange sollten Sie Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® anwenden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Gluko-cyl® N Ho-Len-Complex® auftreten?

In sehr seltenen Fällen kann es zum Auftreten einer Phenolallergie kommen.

### **Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage beschrieben sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Information:** Mai 2011

**Reg.-Nr.** 2522699.00.00