

# Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# **neo-angin<sup>®</sup>**

HALSTABLETTEN

## ZUCKERFREI

Wirkstoffe in einer Lutschtablette: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,20 mg, Amylmetacresol 0,60 mg, Levomenthol 5,72 mg  
Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und bei Erwachsenen.

### **Liebe Patientin, lieber Patient!**

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 - 4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei beachten?
3. Wie sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?**

neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei sind ein Hals- und Rachentherapeutikum. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei beachten?**

neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei dürfen nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol, Pfefferminzöl, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei sind,
- bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren (Levomenthol).

#### **Kinder**

Bei der Anwendung an Kindern ist zu beachten, dass diese die Fähigkeit zu kontrolliertem Lutschen erworben haben müssen.

#### **Bei Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor Kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei dürfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei:**

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Bitte nehmen Sie neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zuckerfrei erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Isomalt. Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

#### **Hinweis**

Bei Fieber, bakterieller Halsentzündung und/oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, da gegebenenfalls eine systemische Antibiotikagabe erforderlich ist.





### 3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?

Wenden Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen alle 2 - 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden).

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 - 4 Tage angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei zu stark oder zu schwach ist.

#### Wenn Sie die Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vergessen haben:

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, wenden Sie bitte nicht die doppelte Menge an, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können neo-angin® Halstabletten zuckerfrei Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und der Durchdrückpackung nach "verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30 °C lagern.

### 6. Weitere Informationen

#### Was neo-angin® Halstabletten zuckerfrei enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

1 Lutschtablette enthält:	2,4-Dichlorbenzylalkohol	1,20 mg
	Amylmetacresol	0,60 mg
	Levomenthol	5,72 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Isomalt 2 H<sub>2</sub>O, Weinsäure (Ph. Eur.), Ponceau 4R (Zubereitung 80 %).

#### Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 24 bzw. 48 Lutschtabletten

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, 12277 Berlin

Tel.: 030/72007-266, Fax: 030/72007-229

E-Mail: [dialog@cassella-med.eu](mailto:dialog@cassella-med.eu)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2015.

## Gebrauchsinformation

# neo-angin®

HALSTABLETTE

**ZUCKERFREI**