

ManukaLind pomata 🇵🇰

Pomata per ferite. Da applicare sulla pelle. Con miele di manuka.

- ManukaLind è un dispositivo medico per la cura delle ferite e può essere utilizzato in tutte le fasi di guarigione delle stesse.

- I cambi di medicazione sono meno dolorosi e traumatizzanti in quanto la pomata, grazie all'umidità persistente, riduce l'adesione della medicazione.

- ManukaLind crea un ambiente umido ideale e con pH ottimale per le ferite.
- ManukaLind ha proprietà antibatteriche grazie alla sua elevata osmolarità e protegge la ferita dai germi invasori grazie alla sua elevata viscosità.

- ManukaLind favorisce lo sbrigliamento autolitico della ferita per una migliore pulizia e per la rimozione dell'escara e della sporcizia.

- ManukaLind contrasta i cattivi odori delle ferite e ne favorisce la granulazione.

Avvertenze per l'uso

- Se necessario può essere applicata più volte al giorno sulla ferita.

- Se possibile pulire con cautela i margini della ferita.

- Applicare una dose generosa di ManukaLind. Tra ManukaLind e l'ambiente della ferita deve sussistere un contatto completo. Riempire le cavità della ferita direttamente con ManukaLind.

- Per coprire la ferita trattata è possibile utilizzare una benda sterile adeguata.

- Se si utilizzano medicazioni interattive (ad es. schiuma di poliuretano o idrocolloidi), occorre fare attenzione che non contengano sostanze attive (ad es. le medicazioni in idrogel possono contenere sostanze attive specifiche) perché non è disponibile alcuna esperienza in merito alla compatibilità con ManukaLind.

- La medicazione deve essere cambiata quando è satura di essudato della ferita o quando l'essudato fuoriesce dalla stessa medicazione di copertura.

- Durante il cambio/la rimozione del bendaggio può essere opportuno pulire/lavare la ferita con acqua e applicare nuovamente ManukaLind.

- Durante la cura della ferita e il cambio della medicazione è necessario osservare le attuali linee guida sull'igiene e la prevenzione delle infezioni. Ciò comprende almeno un'accurata disinfezione delle mani, l'uso di guanti sterili monouso e la protezione della bocca e del naso.

Campi di applicazione / Indicazioni

ManukaLind può essere utilizzato su irritazioni cutanee e ferite. Questi includono: ferite e ulcere acute e croniche, ferite infette, ferite chirurgiche, ustioni chirurgiche (grado I e II) e scottature, ferite necrotiche, ferite diabetiche, piaghe da decubito, ulcere da decubito, ferite poco cicatrizzanti, tagli e abrasioni, ferite superficiali, cura delle cicatrici per le ferite sutureate, ferite da morso, ulcere dei piedi e delle gambe (venose, arteriose).

Controindicazioni

- Da non utilizzare su pazienti con allergia nota ai prodotti delle api (ad es. miele, polline, propolis, ecc.), olio di timo o di lavanda.

- Non usare su ferite molto umide, ustioni di terzo grado, in cavità strette e profonde o nei seni paranasali.

- Non adatto per l'impiego su bambini di età inferiore a 12 mesi e donne in stato interessante o in allattamento.

- Non esiste alcuna evidenza di un innalzamento dei livelli glicemici in pazienti con diabete a seguito dell'uso della pomata in quanto il prodotto non viene riassorbito. Tuttavia, prima di usare ManukaLind, i diabetici dovrebbero consultare il loro medico curante.

Misure precauzionali e avvertenze

- Evitare il contatto diretto tra l'apertura del tubetto e la ferita. Usare un solo tubetto per paziente.

- Risciacquare bene in caso di contatto con gli occhi.

- Dopo l'applicazione può verificarsi un leggero bruciore o di strarimento della pelle. In caso di dolore persistente rimuovere il bendaggio, lavare la ferita con acqua ed eventualmente consultare il medico.

- In caso di reazioni allergiche interrompere immediatamente la terapia e rivolgersi al medico.

- Se dopo 3 settimane non si ottiene l'effetto desiderato interrompere l'uso e consultare il proprio medico.

Ingredienti

Macrogol, miele di manuka, oli essenziali (olio di lavando, olio di timo).

Smaltimento

Le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

ManukaLind tepalas 🇵🇰

Tepalas žaidoms gydyti. Skirtas naudoti ant odos. Su manukos medumi.

- „ManukaLind“ yra medicinos produktas, skirtas žaizdų priežiūrai ir gali būti naudojamas visais žaizdų gijimo etapais.

- Tvarkingas pakeitimas yra mažiau skausmingas ir traumuojantis, nes dėl nuolatines drėgmės tepalas sumažina tvarsčio sukibimą

- „ManukaLind“ sukuria idealiai drėgną ir optimalaus pH žaizdos aplinką.

- Dėl didelio osmoliskumo „ManukaLind“ pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir dėl didelio klampumo apsaugo žaizdą nuo įsiveržiančių mikrobus.

- „ManukaLind“ skatina autolitinį žaizdos sekreto susidarymą, dėl kurio valosi žaizda ir pašalinami šašai bei nešvarumai.

- „ManukaLind“ neutralizuoja žaizdų kvapą ir skatina žaizdų granuliaciją.

Naudojimo nurodymai

- Jei reikia, galima ant žaizdos tepti kelis kartus per dieną.

- Kur reikia, atsargiai išvalykite žaizdos kraštus.

- Gausiai užtepkite „ManukaLind“. Tarp „ManukaLind“ ir žaizdos dugno turi būti pilnas kontaktas. Žaizdos ertmės pripildykite „ManukaLind“.

- Taip sutvarkytą žaizdą galite uždengti tinkamu steriliu tvarsčiu.

- Jei naudojami interaktyvūs tvarsčiai (pvz., polistireninis putplastis arba hidrokoloidai), reikia pasirūpinti, kad juose nebūtų veiklių medžiagų, nes nėra suderinamumo su „ManukaLind“ patirties.

- Dengiamąjį tvarstį reikėtų keisti, kai jis prisigers žaizdos skysčio (eksudato) arba, kai per dengiantįjį sluoksnį ims skystis žaizdoje esantis skystis.
- Nuimdami / keisdami tvarstį, jei reikia, žaizdą praskalaukite / praplaukite vandeniu ir iš naujo užtepkite „ManukaLind“.

- Gydant žaizdas / keičiant tvarsčius, reikia laikytis šiuo metu galiojančių higienos ir infekcijų prevencijos rekomendacijų. Tai apima bent kruopštų rankų dezinfekavimą, sterilių vienkartinių pirštinių dėvėjimą ir burnos bei nosies apsaugą.

Taikymo sritys / indikacijos

„ManukaLind“ galima naudoti odos sudirgimo ir žaizdų gydymui. Tai apima: imines ir lėtinės žaizdas ir opas, užkūstas žaizdas, chirurgines žaizdas, operacines žaizdas, nudegimus (I ir II laipsnio) ir nuplikimus, nekrozinės žaizdas, diabetines žaizdas, dengtas žaizdas, pragulas, blogai gyjančias žaizdas, įpjovimus ir įbrėžimus, paviršines žaizdas, susiūtų žaizdų ir žaizdų po įkandimo randų priežiūrą, odos sudirgimus, pėdų ir kojų opas (venų, arterijų).

Kontraindikacijos

- Nenaudokite pacientams, kuriems yra žinoma alergija bičių produktams (pvz., medui, žiedadulkėms, propolisi ir kt.), čiobreliai ar levandų aliejui

- Nenaudokite labai laipsnuojančioms žaizdoms, trečio laipsnio nudegimams, giliose, siaurose ertmėse / žaizdų vietose ar sinusuose.

- Netinka naudoti jaunesniems nei 12 mėnesių vaikams ir neščioms ar kūdikiams maitinančioms moterims.

- Nėra informacijos, kad pacientams sergantiems cukriniu diabetu panaudojus tepalą padidėtų cukraus kiekis kraujyje. Vis dėlto, diabetu sergants pacientai prieš naudodami „ManukaLind“ turėtų pasitarti su juos gydančiu gydytoju.

Atsargumo priemonės ir įspėjamieji nuorodymai

- Atidarę tubelę venkite tiesioginio kontakto su žaizda. Vieną tubelę naudokite vienam pacientui.

- Patekus į akis, kruopščiai išskalaukite.
- Panaudojus gali lengvai deginti arba tempti. Esant pastoviam diskomfortui nuimkite tvarstį, žaizdą praskalaukite ir, jei reikia, pasitarkite su gydytoju.

- Esant alerginėms reakcijoms gydymą iš karto nutraukite ir susisiekite su gydytoju.
- Jei per 3 savaites nepasieksite norimo poveikio, nutraukite naudojimą ir pasitarkite su gydytoju.

Sudėtinės medžiagos

Makrogolis, manukos medus, eteriniai aliejai (levandų aliejus, čiobrelių aliejus).

Utilizavimas

Tuščias pakutes galima utilizuoti su buitiniems atliekomis.

ManukaLind ziede 🇵🇰

Brūču ziede. Uzklāšanai uz ādas. Ar Manuka medu.

- ManukaLind ir medicīnas produkts brūču kopšanai, un to var izmantot visos brūču dzīšanas posmos.
- Pārsēju maiņa ir mazāk sāpīga un traumējama, ja ziede noturīgā mitruma dēļ samazina pārsēju sākeri.

- ManukaLind rada ideāli mitru un pH optimizētu brūču vidi.
- Pateicoties augstajai osmolaritātei, ManukaLind piemīt antibakteriālas īpašības, un augstās viskozitātes dēļ brūce tiek aizsargāta pret mikrobu iekļūšanu.

- ManukaLind veicina brūces pašnoārdīšanās sekreciju, lai brūce izīrtītos un tiktu noņemta krevele un netīrumi.

- ManukaLind neitralizē brūces smaku un veicina brūču granulāciju

Lietošanas norādījumi

- Pēc vajadzības var uzklāt vairākas reizes dienā brūces kopšanai.

- Ja nepieciešams, rūpīgi notīriet brūces malas.

- Bagātīgi uzklājiet ManukaLind. ManukaLind ir brūces pamatnei pilnībā jāskaras. Brūču dobumus aizpildiet ar ManukaLind.

- Apstrādātas brūces nosegānai var izmantot piemērotu sterilu pārsēju.

- Ja tiek izmantoti interaktīvie pārsienamie materiāli (piemēram, polikarbons vai hidrokoloidi), rūpīgi jāpārliecinās, ka tie nesatur aktīvās vielas (piemēram, hidroģēla pārsienamie materiāli var saturēt specifiskas aktīvās vielas), jo nav pieejama pieredze attiecībā uz saderību ar ManukaLind.

- Brūces pārsēji ir jāmaina, kad tas ir piesūcies ar brūces sekretu (eksudātu) vai pārsējs ļaiz cauri brūces sekretu.
- Noņemot/mainot pārsēju, pēc vajadzības noskalojiet/notīriet brūci ar ūdeni un vēlreiz uzklājiet ManukaLind.

- Ārstējot brūces / mainot pārsējus, jāievēro šādas šķīdās esošās higiēnas un infekciju profilakses vadlīnijas. Tas ietver vismaz rūpīgu roku dezinfekciju, steriliu vienreizlietojamo cimdū un mutes un deguna aizsargziedķerū izmantošanu.

Lietošanas jomas / Indikācijas

ManukaLind var lietot ādas kairinājumu un brūču gadījumos. Tie ietver: akūtas un hroniskas brūces un čūlas, inficētas brūces, operāciju brūces, apdegumus (I un II pakāpe) un applaucējumus, nekrotiskās brūces, diabētiskās brūces, pārkārtas brūces, izgulējumus čūlas, slikti dzīstošas brūces, griezumus un nobrāzumus, virspusējās brūces, rētu kopšana šūtam brūcēm, kodumiem, pēdu un kāju čūlām (vēnu, arteriju).

Kontraindikācijas

- Nelietot pacientiem ar zināmu alerģiju pret bišu produktiem (piemēram, medu, ziedputekšņiem, propolisu utt.), timiāna vai lavandas eļļu.
- Nelietot Joti mitrām brūcēm, trešās pakāpes apdegumiem, dziļiem, šauriem dobumiem / brūču vietām vai deguna blakusdobumiem.

- Nav piemērots lietošanai bērniem, kas jaunāki par 12 mēnešiem, kā arī grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav piemērots lietošanai bērniem, kas jaunāki par 12 mēnešiem, kā arī grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nelietot pacientiem ar zināmu alerģiju pret bišu produktiem (piemēram, medu, ziedputekšņiem, propolisu utt.), timiāna vai lavandas eļļu.

- Nelietot Joti mitrām brūcēm, trešās pakāpes apdegumiem, dziļiem, šauriem dobumiem / brūču vietām vai deguna blakusdobumiem.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Nav ziņojumu par palielinātu kura līmeni asinis pacientiem ar cukura diabētu pēc ziedes lietošanas, jo produkts netiek uzsūkts. Tomēr diabēta slimniekiem pirms ManukaLind lietošanas būtu jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

- Bij het verwijderen/verwisselen van het verband de wond eventueel met water spoelen/reinigen en Manuka-Lind opnieuw aanbrengen.

- Bij wondverzorging / verbandwisselen moeten de huidige richtlijnen voor hygiëne en infectiepreventie in acht worden genomen. Dit omvat op zijn minst een grondige hand-desinfectie, het gebruik van steriele wegwerphandschoenen en mond- en neusbescherming.

Toepassingsgebieden / Indicaties

ManukaLind kan gebruikt worden bij huidirritaties en wonden. Deze omvaten: acute en chronische wonden en zweren, geïnfecteerde wonden, chirurgische wonden, brandwonden (graad I en II) en brandblaren, necrotische wonden, diabetische wonden, doorligwonden, decubitus, slecht genezende wonden, snijwonden en schaafwonden, oppervlakkige wonden, lichteverzorging voor hechtwonden, bijtwonden, voet- en bezweren (veneus, arterieel).

Contra-indicaties

- Niet te gebruiken bij patiënten met een bekende allergie voor bijenproducten (bijv. honing, pollen, propolis enz.), tijm- of lavendelolie.

- Niet gebruiken bij wonden met veel vochtafscheiding,, deergegraads brandwonden, in diepe nauwe holtes of sinussen.

- Niet geschikt voor gebruik op kinderen jonger dan 12 maanden en zwangere of zogende vrouwen.

- Er zijn geen gegevens bekend over een verhoogde bloedsuikerspiegel met diabetespatiënten na gebruik van de zelf omdat het product niet wordt opgenomen.

